

RESUMEN DISTRITO MONCLOA-ARAVACA

09. Moncloa-Aravaca

PLANTACIONES

285 alcorques

CLAUSURAS

362 alcorques


| | |
|----------------------|----|
| ARAVACA | 72 |
| ARGÜELLES | 36 |
| CASA DE CAMPO | 48 |
| CIUDAD UNIVERSITARIA | 44 |
| EL PLANTÍO | 12 |
| VALDEMARÍN | 43 |
| VALDEZARZA | 30 |



| Barrios | |
|---------------------------|--|
| 91 - Casa de Campo | |
| 92 - Argüelles | |
| 93 - Ciudad Universitaria | |
| 94 - Valdezarza | |
| 95 - Valdemarín | |
| 96 - El Plantío | |
| 97 - Aravaca | |

| | |
|----------------------|-----|
| ARAVACA | 102 |
| ARGÜELLES | 5 |
| CASA DE CAMPO | 14 |
| CIUDAD UNIVERSITARIA | 58 |
| EL PLANTÍO | 114 |
| VALDEMARÍN | 66 |
| VALDEZARZA | 3 |

Especies propuestas



RESUMEN DISTRITO MONCLOA-ARAVACA

| DISTRITO | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| Especies propuestas | Unidades | % |
| Sophora japonica | 32 | 11% |
| Melia azedarach | 27 | 9% |
| Platanus x hybrida | 19 | 7% |
| Acer X freemanii | 15 | 5% |
| Fraxinus angustifolia 'Raywood' | 12 | 4% |
| Acer platanoides | 12 | 4% |
| Acer X freemanii 'Autum blaze' | 11 | 4% |
| Acer monspessulanum | 11 | 4% |
| Fraxinus angustifolia | 11 | 4% |
| Liriodendron tulipifera | 10 | 4% |
| Celtis australis | 10 | 4% |
| Carpinus betulus | 9 | 3% |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 7 | 2% |
| Acer pectinatum 'Forrestii' | 7 | 2% |
| Acer campestre 'Elsrijk' | 7 | 2% |
| Photinia x fraseri 'Red Robin' | 7 | 2% |
| Fraxinus excelsior | 7 | 2% |
| Paulownia tomentosa | 6 | 2% |
| Ligustrum japonicum | 6 | 2% |
| Liquidambar styraciflua | 5 | 2% |
| Ligustrum japonicum 'Variegata' | 5 | 2% |
| Acer buergerianum | 4 | 1% |
| Tilia cordata 'Greenspire' | 4 | 1% |
| Acer pseudoplatanus | 4 | 1% |
| Acer diabolicum | 3 | 1% |
| Firmiana simplex | 3 | 1% |
| Callistemon citrinus 'Capitan Cook' | 3 | 1% |
| Lagerstroemia indica | 3 | 1% |
| Corylus colurna | 3 | 1% |
| Celtis occidentalis | 2 | 1% |
| Gleditsia triacanthos 'Inermis' | 2 | 1% |
| Sorbus aria | 2 | 1% |
| Cercis siliquastrum | 2 | 1% |
| Koeleruteria paniculata 'Fastigiata' | 2 | 1% |
| Prunus avium | 2 | 1% |
| Hibiscus syriacus | 1 | 0% |
| Acer X freemanii 'Armstrong' | 1 | 0% |
| Zelkova serrata | 1 | 0% |
| Acer saccharinum | 1 | 0% |
| Morus alba 'Fruitless' | 1 | 0% |
| Koeleruteria paniculata | 1 | 0% |
| Tilia platyphyllos | 1 | 0% |
| Punica granatum | 1 | 0% |
| Acer tataricum 'Ginnala' | 1 | 0% |
| Albizia julibrissin | 1 | 0% |
| Total | 285 | 100% |

| BARRIOS | | |
|--------------------------------------|-----------|----------|
| CASTILLA | 64 | % |
| Sophora japonica | 16 | 25% |
| Celtis australis | 10 | 16% |
| Carpinus betulus | 7 | 11% |
| Aesculus hippocastanum | 6 | 9% |
| Platanus x hybrida | 5 | 8% |
| Robinia pseudoacacia | 4 | 6% |
| Acer X freemanii | 4 | 6% |
| Fraxinus angustifolia | 4 | 6% |
| Melia azedarach | 3 | 5% |
| Acer platanoides | 2 | 3% |
| Photinia x fraseri 'Red Robin' | 2 | 3% |
| Cupressus sempervirens | 1 | 2% |
| CIUDAD JARDÍN | 54 | % |
| Acer platanoides 'Crimson King' | 10 | 19% |
| Platanus x hybrida | 10 | 19% |
| Melia azedarach | 9 | 17% |
| Celtis australis | 6 | 11% |
| Sophora japonica | 5 | 9% |
| Ligustrum japonicum | 5 | 9% |
| Photinia x fraseri 'Red Robin' | 4 | 7% |
| Pyrus calleryana | 2 | 4% |
| Tilia cordata | 2 | 4% |
| ARGÜELLES | 36 | % |
| Sophora japonica | 8 | 22% |
| Fraxinus angustifolia | 8 | 22% |
| Acer pectinatum 'Forrestii' | 7 | 19% |
| Platanus x hybrida | 5 | 14% |
| Acer diabolicum | 3 | 8% |
| Prunus avium | 2 | 6% |
| Ligustrum japonicum | 2 | 6% |
| Acer tataricum 'Ginnala' | 1 | 3% |
| CASA DE CAMPO | 48 | % |
| Sophora japonica | 8 | 17% |
| Acer platanoides | 7 | 15% |
| Photinia x fraseri 'Red Robin' | 4 | 8% |
| Fraxinus excelsior | 4 | 8% |
| Acer monspessulanum | 4 | 8% |
| Acer buergerianum | 4 | 8% |
| Lagerstroemia indica | 3 | 6% |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 3 | 6% |
| Acer X freemanii | 3 | 6% |
| Fraxinus angustifolia 'Raywood' | 3 | 6% |
| Celtis australis | 2 | 4% |
| Paulownia tomentosa | 1 | 2% |
| Albizia julibrissin | 1 | 2% |
| Koeleruteria paniculata 'Fastigiata' | 1 | 2% |
| CIUDAD UNIVERSITARIA | 44 | % |
| Sophora japonica | 9 | 20% |
| Platanus x hybrida | 8 | 18% |
| Melia azedarach | 5 | 11% |
| Paulownia tomentosa | 4 | 9% |
| Celtis australis | 3 | 7% |
| Photinia x fraseri 'Red Robin' | 3 | 7% |
| Sorbus aria | 2 | 5% |
| Acer X freemanii | 2 | 5% |
| Liquidambar styraciflua | 2 | 5% |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 1 | 2% |
| Fraxinus angustifolia | 1 | 2% |
| Acer pseudoplatanus | 1 | 2% |
| Hibiscus syriacus | 1 | 2% |
| Fraxinus excelsior | 1 | 2% |
| Koeleruteria paniculata 'Fastigiata' | 1 | 2% |
| EL PLANTÍO | 12 | % |
| Platanus x hybrida | 5 | 42% |
| Corylus colurna | 3 | 25% |
| Zelkova serrata | 1 | 8% |
| Sophora japonica | 1 | 8% |
| Morus alba 'Fruitless' | 1 | 8% |
| Paulownia tomentosa | 1 | 8% |
| VALDEMARÍN | 43 | % |
| Melia azedarach | 18 | 42% |
| Liriodendron tulipifera | 6 | 14% |
| Carpinus betulus | 4 | 9% |
| Liquidambar styraciflua | 3 | 7% |
| Acer platanoides | 2 | 5% |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 2 | 5% |
| Acer X freemanii 'Autum blaze' | 2 | 5% |
| Koeleruteria paniculata | 1 | 2% |
| Acer X freemanii | 1 | 2% |
| Acer pseudoplatanus | 1 | 2% |
| Acer campestre 'Elsrijk' | 1 | 2% |
| Acer saccharinum | 1 | 2% |
| Cercis siliquastrum | 1 | 2% |
| VALDEZARZA | 30 | % |
| Fraxinus angustifolia 'Raywood' | 9 | 30% |
| Acer campestre 'Elsrijk' | 6 | 20% |
| Celtis australis | 4 | 13% |
| Ligustrum japonicum | 3 | 10% |
| Sophora japonica | 2 | 7% |
| Celtis occidentalis | 2 | 7% |
| Gleditsia triacanthos 'Inermis' | 2 | 7% |
| Tilia platyphyllos | 1 | 3% |
| Melia azedarach | 1 | 3% |